



11 3675.6756

Em caso de dúvidas?
Acesse: www.badilab.com.br

US Ultrassonografia
RX Radiografia digital
TC Tomografia computadorizada

Método de eleição primário
 Ótima complementação diagnóstica Limitada contribuição diagnóstica
 Boa contribuição diagnóstica Não traz contribuição diagnóstica

AFECÇÕES	US	RX	TC	OBSERVAÇÕES
ADRENAIS				
Hiperplasia				
Neoplasia				TC pode avaliar estadiamento e ressecabilidade
BAÇO				
Esplenomegalia generalizada				Animais anestesiados para TC tendem a apresentar esplenomegalia
Esplenomegalia localizada				
Neoplasia				TC pode avaliar estadiamento e ressecabilidade
Hematoma / abscesso				
Alterações do parênquima				
BEXIGA				
Cálculo				RX pode requerer cistografia
Massas				RX requer cistografia / TC consegue avaliar melhor colo e trigono
Divertículo				RX requer cistografia
Alterações de parede (cistite crônica)				RX requer cistografia
Retenção urinária (identificação etiológica)				
Ruptura				RX requer cistografia
CAVIDADE ABDOMINAL				
Ascite				TC complementar ao US na avaliação hepática e vascular
Massas abdominais				TC melhor localização de origem de grandes massas
Metástases				Alternativa ao US considerar contraindicações à TC
Linfonodomegalia				RX eventualmente sublombares e torácicos
Hemorragia				US detecta pequenos volumes, monitorização a cada 5-10 minutos, portabilidade
FÍGADO				
Hepatomegalia				
Diminuição de tamanho				
Massas / neoplasia				TC pode avaliar estadiamento e ressecabilidade
Doenças do parênquima				
Congestão				
Shunt porto-sistêmico				Requer US Doppler hepático
HÉRNIAS				
Inguinal / Umbilical				
Perineal				
Eventração				
Diafragmática				
OVÁRIOS				
Massas				TC pode avaliar estadiamento e ressecabilidade
Cistos				
PANCRÊAS				
Pancreatite				TC pode ter valor limitado nas formas leves
Neoplasia				TC pode avaliar estadiamento e ressecabilidade



PRÓSTATA

Avaliação do tamanho				US normal pouco estabelecido (subjetivo)
Hiperplasia benigna				
Prostatites				
Abscessos				
Neoplasias				TC não define ruptura de cápsula, bom para avaliar alterações extraprostáticas
Cistos paraprostáticos				

RINS

Hidronefrose				TC tem melhor avaliação dos ureteres para localização de obstruções. Rx - Urografia excretora
Cálculos				
Avaliação do tamanho				
Doenças do parênquima				
Doenças Perirenais				
Cistos / hematoma				
Massas / neoplasia				TC pode avaliar estadiamento e ressecabilidade

TESTÍCULOS

Neoplasia				TC é mais útil para o estadiamento
Orquite				
Abdominal				

TRATO GASTROINTESTINAL

Enterite crónica				
Obstrução intestinal				
Intussuscepção intestinal				
Corpo estranho				Indicação variável: individualizada segundo a história
Neoplasia				TC pode avaliar estadiamento e ressecabilidade
Dilatação - torção gástrica				
Fecaloma				

URETRA

Cálculo				RX pode requerer uretrografia
Ruptura				RX requer uretrografia
Estenose				RX requer uretrografia
Massas				RX requer uretrografia

ÚTERO

Piometra / mucometra				US define diagnóstico
Massas				TC pode avaliar estadiamento e ressecabilidade
Metrite / endometrite				
Granuloma de coto				
Diagnóstico de gestação 15 - 42 / 45 dias				
Diagnóstico de gestação superior a 45 dias				
Idade gestacional				
Tamanho fetal				
Número de fetos				
Apresentação fetal (pélvica)				
Viabilidade fetal				
Morte fetal				
Estresse / sofrimento fetal				
Distocias				Pode não determinar a causa em ambos exames.
Retenção fetal				

VIAS BILIARES

Litíase				
Obstrução				
Colecistite				TC em formas avançadas